



El pez corta bolas. Un pez emparentado con las pirañas, de hasta 25 kilos de peso, con dientes que parecen humanos y una supuesta predilección especial por los testículos humanos. Con esos ingredientes, y estando en verano, es fácil hacer saltar las alarmas si se le añade un toque más: se han localizado varios ejemplares fuera de su hábitat y su territorio. Incluso una supuesta leyenda negra habla de varios pescadores en [Papúa](#) que murieron desangrados cuando un banco de Pacús les arrancaron los testículos.



El topo de nariz estrellada o topo estrellado (*Condylura cristata*) es una especie de mamífero soricomorfo de la familia Talpidae que se distribuye por Norteamérica, especialmente en la costa nordeste de Estados Unidos. Es el único representante de la tribu Condylurini y del género *Condylura*.



gato esfinge (también llamado de forma común pero erróneamente **gato egipcio**) es una raza de [gato](#) originaria de [Canadá](#). La característica más llamativa de esta raza es la aparente ausencia de pelaje y su aspecto delgado y esbelto. Aunque los ejemplares de la raza parecen ser gatos sin pelos, hay que destacar que verdaderamente no son gatos pelados, sino que presentan la piel cubierta de una capa de vello muy fino, corto y parejo, casi imperceptible a la vista o al tacto.



pez borrón o **pez gota** (*Psychrolutes microporos*) es un [pez](#) de la familia [Psychrolutidae](#) que vive en las aguas de [Nueva Zelanda](#) y el este de [Australia](#). Vive en aguas profundas, más o menos a unos 1000 metros de profundidad. También llamado

en [inglés](#) como *blobfish*, es un animal muy raramente encontrado debido a la inaccesibilidad de su hábitat, rara vez es visto por los seres humanos. Roberto Danovaro, profesor de Biología



cangrejo de los cocoteros (*Birgus latro*) es una [especie](#) de [crustáceo decápodo](#) de la [familia Coenobitidae](#), la única de su [género](#); es el [artrópodo](#) terrestre conocido más pesado que existe (el [cangrejo](#) más grande por longitud es el [cangrejo gigante japonés](#)). El cangrejo de los cocoteros es una especie de [cangrejo ermitaño](#), cuya habilidad característica es abrir [cocos](#) con sus fuertes pinzas para alimentarse de su contenido.



aye-aye (*Daubentonia madagascariensis*) es un [primate estrepsirrino endémico](#) de [Madagascar](#), emparentado con los [lémures](#). Su estrafalaria apariencia hace que se le considere el principal responsable del origen de la palabra "lémur", que quiere decir en [latín](#) «espíritu nocturno». El aye-aye es el único representante vivo de

su [género](#) (*Daubentonia*), [familia](#) (*Daubentonidae*) e [infraorden](#) (*Chiromyiformes*), lo que deja bien a las claras su extrema rareza. Solo se conoce otra [especie](#) próxima al aye-aye, el [aye-aye gigante](#) (*Daubentonia robusta*), que se extinguió hace menos de 1000 años.



tiburón anguila, tiburón de gorguera o clámide² (*Chlamydoselachus anguineus*) es una de las dos especies existentes de [tiburones](#) en la familia [Chlamydoselachidae](#), con una distribución amplia pero irregular en los océanos Atlántico y Pacífico. Esta especie poco común se encuentra en la plataforma continental exterior y la parte superior del

talud continental, por lo general cerca del fondo, aunque hay evidencias de movimientos hacia menores profundidades. Se ha capturado a una profundidad de 1.570 m (5.150 pies), mientras que en la bahía de Suruga, Japón, es más común en las profundidades de 50-200 m (160-660 pies).



pez rosado con manos² (*Brachyopsilus dianthus*) es una [especie](#) de [pez](#) de la

familia [Brachionichthyidae](#). Como el resto de los miembros de esta familia, sus aletas tienen forma de manos, algo que tan solo nueve especies marinas de peces tiene³, y las usa para desplazarse por el fondo marino en lugar de nadar, como hacen otros peces. Se distribuye por el sur de la isla de [Tasmania](#), [Australia](#). Habita la [zona demersal](#) del mar. Se cree que es una especie potencialmente amenazada, ya que es muy rara, y se conoce muy poco sobre su [ecología](#). Estos peces se desplazan muy lentamente, y liberan toxinas a la hora de sus órganos son desconocidos defenderse^{4 5 6}. Este pez utiliza sus manos para caminar por el mar



Sapo Simpsons es un extraño anfibio que presenta una nariz larga y fina, la cual se asemeja a un hocico, posee características similares que recuerdan al Señor Burns de la serie animada los Simpsons, de ahí surge su nombre.



mono sin nariz de Birmania o mono de hocico chato (*Potato*) es una [especie](#) de [primate catarrino](#) de la [familia](#) de los [cercopitécidos](#) originario del norte de [Birmania](#) y la zona adyacente de [China](#). La especie fue nombrada por Geissmann y colaboradores en 2010 a partir de un cráneo y su nombre es en honor al filántropo Jon Stryker. La población conocida se estima que está formada por 260-330 individuos. La especie es conocida en los dialectos locales como "nwoah mey" (mono con una cara hacia arriba).




Este pequeño mamífero volador mide en torno a 40 centímetros aunque, cuando abre sus alas, puede llegar a tener una envergadura de un metro y medio. Su peso puede ser de algo más de 1 kg. y utiliza sus grandes ojos para moverse y localizar su alimento, a diferencia de la mayoría de especies

de murciélagos.



Tyrannobdella rex que significa "sanguijuela reina tirana" es una especie de sanguijuela con dientes descubierta en el año [2007](#), en [Perú](#). Su lugar preferido son las fosas nasales de los humanos. Mide menos de 5 cm, tiene un cuerpo cilíndrico, y vive en las partes remotas de la alta [Amazonía](#).



Habita en las regiones abisales del [mar de Celebes](#), entre [Filipinas](#) e [Indonesia](#).² En 2004, un grupo de investigadores dio con un animal con características muy similares en la India. Este no pudo ser capturado, por lo que su existencia en la India no ha podido ser confirmada.